

ФАКТЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

(mononucleosis)

MONONUCLEOSIS

"**MONONUCLEOSIS**" вызван вирусом Эпштейновского барристера, который, как полагают, присутствует в слюне. Большинство инфекций возникает в маленьких детей, многих взрослых инфекция не касается. Инфекция распространяется через контакт со слюной зараженного человека. Это происходит вероятнее в закрытых или переполненных помещениях. Передача обычно происходит при близком, личном контакте.

ПРИЗНАКИ:

Температура, ангина, вспухшие лимфоузлы, головная боль и усталость. Многие инфекции не проявляют никаких признаков. Взрослые переносят болезнь тяжелее детей.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Инфекционный период неизвестен - вероятно в течение многих месяцев.

ЛЕЧЕНИЕ:

Простые меры, чтобы уменьшить признаки: давать *Tylenol* от температуры, постельный режим. При серьезном заболевании обратиться к врачу.

ПРОФИЛАКТИКА:

- * Хорошо мыть руки.
- * Избегать целования.
- * Не пользоваться посудой и едой после больного.
- * Выбрасывать использованные салфетки в салопановый пакет.

Отдел здравоохранения *Marion County* обеспечивает обслуживание независимо от расы, религии, цвета кожи, национальности, пола, возраста, семейного положения, умственных или физических недостатков, политических убеждений и сексуальной ориентации.