

GONORRHEA



Marion County
OREGON
Health & Human Services

WHAT IS GONORRHEA ?

Gonorrhea is an infection that you can get from sex. This is also known as a sexually transmitted infection (STI). Gonorrhea is a bacterial infection. It's caused by the bacterium *Neisseria gonorrhoeae*. You can get gonorrhea in the genitals, rectum, and throat. This STI is very common among young people who have sex.

HOW IS GONORRHEA SPREAD?

You can get gonorrhea by having unprotected sex with someone who has the infection. This includes oral, anal, or vaginal sex. A pregnant person who has the infection can also pass it to the baby during birth.

WHAT ARE THE SIGNS AND SYMPTOMS OF GONORRHEA ?

You can have gonorrhea and have no symptoms. Gonorrhea can cause symptoms in the genitals, rectum, and throat. Symptoms usually begin 1 to 14 days after having sex with an infected person. Symptoms can vary from person to person.

Symptoms may include:

- Pain or burning with urination
- Penile or vaginal discharge
- Vaginal bleeding between periods or during sex
- Anal itching, pain or bleeding
- Painful bowel movements
- Sore throat
- Swollen lymph nodes

WHAT IS THE TREATMENT FOR GONORRHEA?

Gonorrhea is treatable and curable with antibiotics. If you have gonorrhea, get treated right away. Avoid sex for at least one week after you and your sex partner(s) finish treatment. You can get gonorrhea again even after you have been cured.

HOW CAN YOU PREVENT A GONORRHEA INFECTION?

- Use condoms the right way every time you have sex
- Get tested at least once a year or between sexual partners
- Notify current sex partner(s) to get tested
- Have a closed relationship with a partner who has tested for gonorrhea and does not have it

FOLLOW UP

- Get tested for gonorrhea and other STIs 3 months after treatment
- If diagnosed with gonorrhea in the throat, retest 14 days after treatment. This is to ensure the infection is cured.

SCAN ME 

COMMUNICABLE DISEASE

3160 Center Street NE

Salem, OR 97301

Phone: 503-588-5621

<https://www.co.marion.or.us>

FOR MORE INFORMATION
VISIT THE CDC PAGE
WWW.CDC.GOV/GONORRHEA
OR SCAN QR CODE .





¿QUÉ ES LA GONORREA?

La gonorrea es una infección que se puede contraer a través de las relaciones sexuales. Esto también se conoce como infección de transmisión sexual (ITS). La gonorrea es una infección bacteriana. Es causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*. La gonorrea puede causar infección en los genitales, el recto y la garganta. Es muy común entre los jóvenes que tienen relaciones sexuales.

¿COMO SE PROPAGA LA GONORREA?

Usted puede contraer gonorrea al tener sexo sin protección con alguien que tiene la infección. Esto incluye sexo oral, anal o vaginal. Una persona embarazada que tiene la infección puede pasar la infección al bebé durante el parto.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA GONORREA?

Usted puede tener gonorrea y no tener síntomas. La gonorrea puede causar síntomas en los genitales, el recto y la garganta. Los síntomas generalmente comienzan de 1 a 14 días después de tener sexo con una persona infectada. Los síntomas pueden variar de una persona a otra.

Los síntomas pueden incluir:

- Dolor o ardor al orinar
- Secreción vaginal o en el pene
- Sangrado vaginal entre períodos o durante las relaciones sexuales
- Picazón, dolor o sangrado anal
- Defecaciones intestinales dolorosas
- Dolor de garganta
- Ganglios linfáticos inflamados

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA LA GONORREA?

La gonorrea se puede curar con tratamiento. Si usted tiene una infección, consulte con un médico para recibir tratamiento. Evite tener sexo por una 1 semana después de que usted y su(s) pareja completen tratamiento. Usted puede contraer gonorrea de nuevo. Incluso después de haberse curado.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR UNA INFECCIÓN POR GONORREA?

- Usé condones de la manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales
- Hágase la prueba al menos una vez al año o entre parejas sexuales
- Notifíquelo a su(s) pareja(s) sexual(es) actual(es) para que se hagan la prueba
- Tenga una relación cerrada con una pareja que se ha hecho la prueba de la gonorrea y no la tiene.

¿QUÉ MÁS?

- Hágase la prueba de gonorrea y otras ITS 3 meses después de haber recibido tratamiento
- Si se le diagnostica gonorrea en la garganta, vuelva a realizar la prueba 14 días después del tratamiento. Esto es para asegurar que la infección se curo

ESCANEE AQUÍ 

COMMUNICABLE DISEASE

3160 Center Street NE

Salem, OR 97301

Phone: 503-588-5621

<https://www.co.marion.or.us>

PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITE LA PÁGINA DE CDC EN
WWW.CDC.GOV/GONORRHEA O
ESCANEE EL CODIGO

